



**POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA  
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

**66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Nadodrzańska 24**

NIP: 926-12-96-375, e-mail: pssekrosno@wsse.gorzow.pl  
tel. (068) 383 53 70, 383 80 77, fax (068) 383 53 70

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

---

Krosno Odrzańskie 13.03.2018r.

**NS-EP-428-SZCZ-2/2018**  
(poczta elektroniczna)

**- wg rozdzielnika -**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim w ślad za komunikatem Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii dotyczącym akcji „Wiosna bez pneumokoków”, przesyła w załączeniu szczegóły w/w przedsięwzięcia. Jednocześnie prosi o udostępnienie informacji mieszkańcom oraz zamieszczenie jej na stronach internetowych urzędów.

**Z upoważnienia Państwowego  
Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Krośnie Odrzańskim**  
**KIEROWNIK**  
**Sekcji Higieny Pracy**  
*K. Piętkiewicz*  
**mgr Krystyna Piętkiewicz**

Załącznik:

- komunikat Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice
2. Urząd Gminy Bytnica 52, 66-630 Bytnica
3. Urząd Gminy Dąbie ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie
4. Urząd Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
5. Urząd Miejski w Gubinie ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin
6. Urząd Miasta ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
7. Urząd Gminy Maszewo, 66-614 Maszewo
8. Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10B, 66-600 Krosno Odrzańskie

E.N-K/E.N-K



## **Krajowy Konsultant ds. EPIDEMIOLOGII**

**Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny  
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru**

Ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

Email: [istankiewicz@pzh.gov.pl](mailto:istankiewicz@pzh.gov.pl); tel.: +48 22 54 21 386

Warszawa, 11 marca 2018r.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Przed Państwem szansa bezpłatnego zaszczepienia dzieci przeciw pneumokokom – jednym z najbardziej groźnych bakterii wywołujących ciężkie choroby i często pozostawiających powikłania na całe życie.

Taką możliwość oferuje Państwu Ministerstwo Zdrowia. Można zaszczepić dzieci do 5 r.ż., które dotąd nie otrzymały szczepionki przeciw pneumokokom. Wystarczy tylko zgłosić się do swojego Lekarza Pierwszego Kontaktu.

Zachęcam Państwa do skorzystania z tej możliwości, bo przecież:

„Pneumokoków nie lubimy, więc nasze dzieci zaszczepimy”

Z poważaniem,

Dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz

Konsultant Krajowy ds. Epidemiologii

## Informacja dla Rodziców

**Bakteria *Streptococcus pneumoniae* (dwoinka zapalenia płuc, pneumokok)** należy do najczęstszych przyczyn poważnych zakażeń bakteryjnych u dzieci. Pneumokoki najczęściej wywołują zapalenia górnych dróg oddechowych (ostre zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok przynosowych), ale u niektórych dzieci i osób dorosłych mogą powodować ciężkie, zagrażające życiu zakażenia inwazyjne (posocznica (sepsa) - uogólnione zakażenie, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych) i nieinwazyjne (zapalenie płuc, zapalenie stawów). Zakażenia inwazyjne mogą powodować poważne powikłania, a nawet mogą prowadzić do zgonu.

Zakażenie pneumokokiem przenosi się poprzez wdychanie drobnych kropelek wydzieliny dróg oddechowych i śliny unoszących się w powietrzu oraz przez kontakt bezpośredni z chorym lub nosicielem. Ryzyko zakażenia znacznie się zwiększa, gdy dziecko przebywa w żłobku, przedszkolu lub innej większej grupie dzieci.

Na poważne choroby wywołane przez pneumokoki chorują najczęściej dzieci do 5. roku życia, ale najwięcej powikłań i ciężkich zakażeń inwazyjnych występuje w pierwszych 2 latach życia.

Jedyną skuteczną metodą zapobiegania zakażeniom pneumokokowym jest **szczepienie ochronne**. Szczepionki przeciwko pneumokokom zawierają jedynie mały fragment komórki bakteryjnej.

W Polsce dostępne są dwie szczepionki skoniugowane (10-walentna, 13-walentna), które stosuje się u dzieci od ukończenia 6 tygodnia życia. Obie szczepionki PCV-10 (zawierająca 10 serotypów pneumokoka) i PCV-13 (zawierająca 13 serotypów pneumokoka) są bezpieczne, skuteczne i immunogenne w stosunku do antygenów pneumokoka zawartych w szczepionce. Szczepionki stymulują niedojrzały układ odpornościowy niemowlęcia i małego dziecka i chronią przed zakażeniem typami pneumokoków, które najczęściej wywołują choroby inwazyjne. Szczepionki przeciwko pneumokokom są skuteczne, bezpieczne i nie powodują poważnych problemów zdrowotnych. W wielu krajach niemowlętom i dzieciom do 2. roku życia podano już wiele milionów dawek skoniugowanych szczepionek, nie obserwując poważnych reakcji niepożądanych. Szczepionkę podaje się w postaci zastrzyku domięśniowego.

U niektórych dzieci szczepionka pneumokokowa może wywołać przemijające, łagodne niepożądane odczyny poszczepienne w ciągu 1-3 dni po szczepieniu. Najczęściej (<2%)

są to reakcje w miejscu wstrzyknięcia, takie jak obrzęk, zaczerwienienie i bolesność. Rzadko pojawia się niewysoka gorączka ( $<39^{\circ}\text{C}$ ), złe samopoczucie, brak apetytu oraz płacz częstszy niż zazwyczaj, a bardzo rzadko ( $<0,5\%$ ) - gorączka powyżej  $39^{\circ}\text{C}$ .

**W roku 2017 do Programu Szczepień Ochronnych (PSO) dodano obowiązkowe szczepienie przeciwko pneumokokom dla wszystkich dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 roku. Wprowadzenie nieodpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla wszystkich dzieci urodzonych po 31.12.2016 roku to długo oczekiwana zmiana przez rodziców i lekarzy.** Decyzja o ich wprowadzeniu ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia zakażeń pneumokokowych. Dotychczas (od 2008 roku) szczepionka przeciwko pneumokokom była bezpłatna tylko dla niektórych dzieci, należących do grup ryzyka. **Lekarze w rozmowie z rodzicami powinni informować o możliwości bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom.**